

牧地分别为2,086元、100元和246元,到2000年将分别为3,269元、148元和430元。

参 考 文 献

- 【1】 陈明荣,黄土高原的幅射状况,西北大学学报,1983年3期。
- 【2】 北京大学地理系等,毛乌素沙区自然资源及其改造利用,科学出版社,1984年。

Suggestion to Readjust the Structure for Land Use of Shaanxi Province, "the Three Norths" Shelterbelte Region in China

Song Guiqin Feng Maogong jia"Xin mei

ABSTRACT

According to natural geographic environment, North Shaanxi Province may be divided in three landforms: sany region, Leoss hilly region and loess highland plain region. Since several hundred years the lands have been used improperly. It caused the ecologic environment deteriorated and economy depressed. In order to change the current state fundamentally we have to readjust the structure for land use. Then it may be caused not only the economic level of locative people's life increased, but also a better ecologic environment had been formed.

《中国科学院西北水土保持研究所(1955—1985)

科研成果论文(摘要)汇编》开始整理编印

为庆祝建所30周年,集中反映和检阅我所30年来各项研究工作的进展与成效,我所开始整理编印《中国科学院西北水土保持研究所(1955—1985)科研成果论文(摘要)汇编》(简称《汇编》)。该《汇编》主要包括学术专著内容介绍、公开发表的论文(摘要)、1978年以来获省、部级以上奖励的科技成果简介三个部分。这个《汇编》比较系统地反映了我所建所30年来科研工作的内容、进展和水平。

——所办公室